

ПРИКАЗ

25.08.2021 г.

№ 97

О закреплении кабинетов за классами

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить на время ограничительных мер и до особого распоряжения кабинетную систему образования за исключением уроков технологии, физической культуры, ЛФК, логопедических занятий и занятий с педагогом-психологом и учителем-дефектологом.
2. Закрепить кабинеты за классами:
1 смена
Кабинет №1 – 4 класс
Кабинет № 2 – 1 класс
Кабинет № 3 – 3 класс
Кабинет № 5 – 5а класс
Кабинет № 6 – 1доп. класс
Кабинет № 7 – 9б класс
Кабинет № 8 – 5б класс
Кабинет № 9 – 8 класс
Кабинет № 10 – 9а класс
2 смена
Кабинет № 5 – 6 класс
Кабинет № 10 – 7 класс
3. Обеспечить своевременное проведение дезинфекции в кабинетах рабочих мест согласно графику (Приложение 1), в перемену, во время прогулок групп продленного дня. Дезинфекция кабинетов технологии, спортивного зала, кабинета учителя-логопеда и педагога-психолога проводить после каждого занятия. Контроль: Рахманова О.В., заместитель директора по АХЧ
4. Утвердить инструкцию по проведению дезинфекции помещений при коронавирусе (Приложение 2.)
5. Ознакомить с данной инструкцией весь технический персонал образовательного учреждения. Ответственный: Русакова М.А., медицинский работник школы.


6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



Т.Н.Протасова

С приказом ознакомлены:



М.А.Русакова



О.В.Рахманова

Инструкция

по проведению дезинфекции помещений при коронавирусе.

1. Общие положения

- 1.1. Настоящая инструкция по проведению дезинфекции помещений при коронавирусе разработана на основании Письма Роспотребнадзора от 23 января 2020 года № 02/770-2020-32 «Об инструкции по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусом». Действие инструкции распространяется на всех работников, принимающих участие в проведении дезинфекции и обработки помещений.
- 1.2. Данная инструкция от дезинфекции помещений при коронавирусе содержит основные требования, предъявляемые и дезинфекции помещений в учреждении и личной гигиены работников, особенностям проведения профилактических мероприятий, санитарной обработке помещений, обеспечению работников средствами защиты и другие необходимые мероприятия для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
- 1.3. В связи с неблагоприятной ситуацией по новой коронавирусной инфекции работники (уборщики) докладываются к работе после прохождения вышланового инструктажа по изучению профилактических мер по предупреждению распространения инфекции, детального изучения данной инструкции, а также с соблюдением всех мер предосторожности.
- 1.4. Обслуживающий персонал должен соблюдать инструкцию по проведению дезинфекции помещений при коронавирусной инфекции, иметь доступ к работе.
- 1.5. Профилактическая дезинфекция начинается немедленно при возникновении угрозы заболевания с целью предупреждения проникновения и распространения возбудителя заболевания в коллективы людей на объектах, территориях и т.д., где это заболевание отсутствует, но имеется угроза его заноса извне.
- 1.6. Согласно рекомендаций Роспотребнадзора, для дезинфекции могут быть использованы средства из различных химических групп

- ❖ **хлорактивные** (натриевая соль дихлорантисептициновой кислоты - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин Б - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0%);
 - ❖ **кислородокислительные** (перекись водорода в концентрации не менее 3,0%);
 - ❖ **капионные** поверхностно-активные вещества (КПАВ)- четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%);
 - ❖ **третичные амины** (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%);
 - ❖ **полимерные** производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2%);
 - ❖ **спирты** (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки больших по площади поверхностей – изопропиловый спирт в концентрации не менее 70%.
- Порядок использования отдельных дезинфекционных средств, рекомендуемых органами Роспотребнадзора, и режимы дезинфекции приводятся в инструкциях по применению используемых средств.

- 1.7. Работники с целью соблюдения требований по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции должны:

График проведения дезинфицирующих мероприятий в помещениях ГБОУ СО « Серовская школа № 2»

1. КЛАССНЫЕ КОМНАТЫ (обработка контактных поверхностей).

С понедельника по пятницу

- 08.50 – 7 и 10 кабинеты
- 09.40 – 5,8 и 9 кабинеты
- 10.40 – 1, 2, 3 и 6 кабинеты
- 11.20 – 7 и 10 кабинеты
- 12.10 – 5,8 и 9 кабинеты
- 12.20 – 1, 2, 3 и 6 кабинет
- 13.40 – 5 и 9 кабинет (с влажной уборкой)
- 14.10 – 1, 2, 3 и 6 кабинеты (с влажной уборкой)
- 15.40 – 5 и 9 кабинеты
- 16.00 1, 3 и 6 кабинеты

Суббота

- 09.40 – 5, 8 и 9 кабинеты
- 10.30 – 7 и 10 кабинеты

2. СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ, КАБИНЕТЫ ТЕХНОЛОГИИ – на каждой перемене после проведения занятия в нем согласно составленному расписанию уроков.

3. ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ, КАБИНЕТ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА, ЛФК - после каждого посещения обучающимися.

4. КАБИНЕТ ТПМК: после каждого посетителя.

5. БИБЛИОТЕКА обработка по мере необходимости (после проведения занятия в библиотеке)

6. КОРИДОРЫ, ТУАЛЕТНЫЕ КОМНАТЫ, ТАМБУР – по время каждого урока.

7. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ – ежедневно в конце дня.

- строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса COVID-19 на территории учреждения, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях;
 - соблюдать рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции для работников;
 - оповещать о любых отклонениях в состоянии здоровья. Работник с симптомами заболевания не допускается к работе и направляется в медицинское учреждение. Возобновление допуска к работе возможно только при наличии справки лечебного учреждения о выздоровлении;
 - соблюдать в порядке и чистоте свое рабочее место, уборочный инвентарь;
 - содействовать и сотрудничать с руководителем в деле для обеспечения здоровых и безопасных условий труда, незамедлительно сообщать своему непосредственному руководителю или иному должностному лицу о любом ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков новой коронавирусной инфекции;
 - выполнять все нормы и обязательства по охране труда, установленные коллективным договором, соглашениям, трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями;
 - внимательно выполнять свои должностные обязанности, не отвлекаться;
 - пользоваться и правильно применять СИЗ, одноразовые медицинские маски носить согласно правилам ношения маски при коронавирусе, одноразовые перчатки, а также кожные антисептики для обработки рук, дезинфицирующие средства согласно условиям и характеру выполняемой работы;
 - при отсутствии средств защиты и дезинфицирующих средств незамедлительно ставить в известность об этом прямого руководителя;
 - незамедлительно уведомлять прямого или вышестоящего руководителя о любой ситуации, несущей угрозу жизни или здоровью работников и окружающих, о происшедшем несчастном случае, ухудшении состоянии своего здоровья;
 - Придерживаться всех требований и предписаний по нераспространению новой коронавирусной инфекции;
 - Знать пути передачи, признаки заболевания и меры профилактики коронавируса в учреждении, методы предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
- 1.8. Работники должны знать, что механизмами передачи коронавирусной инфекции являются **воздушно-капельный, контактный, фекально-оральный пути.**
- 1.9. Работники обеспечены, согласно установленным нормам, санитарной одеждой, санитарной обувью и санитарными принадлежностями, дезинфицирующими средствами.
- 1.10. Обязательному персоналу, занимающемуся дезинфекцией помещений, необходимо:
- ✓ **санитарную одежду и обувь хранить в установленных для этого местах;**
 - ✓ **верхнюю одежду, обувь, головные уборы, а также личные вещи оставлять в гардеробе;**
 - ✓ **выполнять работу исключительно в чистой санитарной одежде и менять ее по мере загрязнения;**
 - ✓ **неукоснительно соблюдать меры личной гигиены;**
 - ✓ **производить смену масок не реже 1 раза в 3 часа;**
 - ✓ **Обработывать руки дезинфицирующими средствами;**
 - ✓ **Иметь запас дезинфицирующих средств, необходимый технический инвентарь в достаточном количестве.**
- 1.11. С целью предупреждения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции, железнодорожных паразитарных и иных заболеваний работникам необходимо знать и строго соблюдать нормы и правила личной гигиены.
- коротко подстригать ногти, не наносить на них лак;
 - тщательно мыть руки с мылом (обладающим дезинфицирующим действием) перед тем как начать работу, переходя от выполнения одной операции к другой,

после перерыва в работе, прикосновения к загрязненным предметам, а также после посещения санузла, перед приемом пищи и по окончании работы.

1.12. Обслуживающий персонал несет ответственность за соблюдение требований данной инструкции по проведению дезинфекции помещений при коронавирусе согласно законодательству Российской Федерации.

2. Санитарно-гигиенические требования перед началом проведения профилактической дезинфекции.

2.1. В организации (учреждении) приняты локальные нормативные акты по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, соблюдение которых обязательно для всех работников.

2.2. Организована системная работа по информированию работников о рисках новой коронавирусной инфекции COVID-19, мерах личной профилактики, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при выявлении первых симптомов ОРВИ.

2.3. Для работников на основании существующих документов и рекомендаций Роспотребнадзора разработаны и направлены правила личной и производственной гигиены, инструкции по применению дезинфицирующих средств.

2.4. С целью профилактики и борьбы с коронавирусом (COVID-19). Проводят профилактическую и текущую дезинфекцию. Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке в Российской Федерации, ведется журнал обработки помещений при коронавирусе. В инструкциях по применению этих средств указаны режимы для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

2.5. Ежедневно перед началом работы всем сотрудникам ответственным лицом (медицинским работником) измеряется температура тела с занесением результатов термометрии в журнал измерения температуры сотрудников.

2.6. При температуре 37,0 и выше, либо при других явных признаках ОРВИ, работник отстраняется от работы и направляется домой для вызова медицинского работника на дом.

2.7. Перед началом работы обслуживающий персонал организации обеспечивается запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа). Одноразовых перчаток для использования их при работе, а также дезинфицирующими салфетками, либо кожных антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается.

2.8. Работники обязаны выполнять правила личной гигиены производственной санитарии. Перед началом работы необходимо вымыть руки. Для механического удаления загрязнений микрочастицы рук моют теплой проточной водой с мылом в течение 1-2 минут, в том числе после сотового телефона, обращая внимание на okolоногтевые пространства. Оптимально пользоваться сортами мыла с высокой пенообразующей способностью. Затем руки ополаскивают водой для удаления мыла и обрабатывают дезинфицирующими средствами (антисептиками) для рук, содержащие не менее 60% спирта, (влажные салфетки или гель).

2.10. Надеть спецодежду, специальную обувь, одноразовую маску для лица, резиновые перчатки.

2.11. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения.

2.12. Перед дезинфекцией следует приготовить (развести) рабочий раствор дезинфицирующего средства в емкости согласно противовирусному режиму, указанному в инструкции на используемое средство. В отдельной емкости приготовить рабочий раствор дезинфицирующего средства для периодической обработки рук в процессе дезинфекции.

2.13. на каждое убираемое помещение следует подготовить отдельный уборочный инвентарь (вешалка, емкость для разведения рабочего раствора и др.).

2.14. Дезинфицирующие средства следует хранить в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для посторонних. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении дезсредством изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в Инструкции по их применению.

3. Санитарно-гигиенические требования во время проведения профилактической дезинфекции в помещениях для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

3.1. Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе и включает в себя меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом и обработку их кожными антисептиками, дезинфекцию столовой и кухонной посуды, проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств.

3.2. Дезинфекцию следует начинать с уборки более чистых помещений (кабинеты, офисы) и заканчивая более загрязненными (холлы, лестничные проемы, коридоры, санузлы).

3.3. Следует по возможности проводить дезинфекцию одновременно с проветриванием.

3.4. Ветoshью смоченной в подготовленном дезинфицирующем растворе, следует протереть поверхности столов, клавиатуры, подлокотников, выключателей, предметы обстановки, оборудование.

3.5. после обработки поверхностей использованную ветошь, салфетки необходимо сложить в отдельный мусорный мешок.

3.6. Обработать руки в перчатках на протяжении 1-2 минут в подготовленном дезинфицирующем растворе.

3.7. Приступить к обработке полов.

3.8. Во время проведения профилактической дезинфекции санитарных узлов следует подвергнуть тщательной обработке поверхности выключателей, водопроводных кранов, умывальников, унитазов.

3.9. Дезинфекционная обработка всех контактных поверхностей (выключателей, дверных ручек и поручней, перил, поверхностей столов и спинок стульев, оргтехники) проводится каждые 2-4 часа.

3.10. В случае проведения дезинфекции способом орошения используют следующие средства индивидуальной защиты (СИЗ): органы дыхания защищают респиратором, глаза – защитными очками или используют противовирусные СИЗ органов дыхания с изолирующей лицевой частью.

3.11. Правила использования одноразовой медицинской маски

- надевать маску при выполнении работ по профилактической или текущей дезинфекции;
- перед тем как взять маску в руки, следует обработать их спиртосодержащим средством или вымыть с мылом;
- надевать маску следует так, чтобы она закрыла рот, нос, подбородок и плотно фиксировалась (при наличии завязок на маске следует крепко завязать). Если одна из поверхностей маски имеет цвет то маску надевают белой стороной к лицу;

• специальные склады на маски следует развернуть, винтовую гибкую ленту в области носа, следует плотно прижать к спинке носа для обеспечения более плотного прилегания к лицу;

• использовать маску однократно, повторное использование маски не допустимо;

• менять маску необходимо каждые 3 часа или чаще. Если маска увлажнилась, следует немедленно заменить на новую; после использования маски, выбросить её в пакет, который плотно завязать, а затем выбросить в пакет для отходов;

• снять перчатки и вымыть руки с мылом (30-40 секунд);

• После мытья руки следует обработать спиртосодержащим кожным антисептиком;

• После обработки рук, при необходимости, надеть новую маску.

3.12. Во время работы по проведению дезинфекции помещений следует соблюдать инструкции по охране труда при уборке помещений, инструкцию по проведению дезинфекции помещений учрежденя при коронавирусной инфекции, меры предосторожности, приведенные в эксплуатационной документации предприятия – изготовителя дезинфицирующих средств.

4. Алгоритм действий в случае подозрения в заболевании новой коронавирусной инфекции.

4.1. Работник у которого имеются подозрения на заболевания новой коронавирусной инфекции COVID-19, извещает своего непосредственного руководителя о своем состоянии.

4.2. При появлении подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, направить вызов в специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи, содействовать направлению пациента в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях.

4.3. использовать бактерицидные облучатели или другие устройства для обеззараживания воздуха и (или) поверхности для дезинфекции воздушной среды помещения (при наличии). В случае необходимости, обеспечить проведение дезинфекции помещений силами специализированной организации.

4.4. В случае выявления заболевших после удаления больного и освобождения помещений от людей проводится заключительная дезинфекция силами специализированных организаций. Для обработки используют наиболее надежные дезинфицирующие средства на основе хлорактивных и кислородоактивных соединений. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь производственных помещений, обеденных залов, санузлов. Посуду больного, загрязненную остатками пищи, дезинфицируют путем погружения в дезинфицирующий раствор и только затем тщательно промываются проточной водой в течение 10 минут. При обработке поверхностей применяют способ орошения. Воздух в отсутствие людей рекомендуется обрабатывать с использованием открытых переносных ультрафиолетовых облучателей, аэрозольной дезинфицирующей средстве.

4.5. При подтверждении у работника заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 уполномоченное должностное лицо формирует сведения о контактах работника в рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14 дней и уведомляет руководителя и всех работников, входящих в данный список, о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

5. Санитарно-гигиенические требования по окончании проведения профилактической дезинфекции в помещениях для предупреждения распространения коронавируса.

5.1. Уборочный инвентарь следует замочить в дезинфицирующем растворе методом погружения, затем высушить и убрать в отведенное место.

5.2. После проведения профилактической дезинфекции обслуживающий персонал должен:

- *обработать резиновой обувью сапожками или ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства, использованную ветошь или салфетки поместить в отдельный мусорный пакет;*
- *обработать руки в перчатках рабочим дезсредством (1-2 минуты) при помывке заранее в отдельной емкости и используемым для обработки рук в перчатках;*
- *снять спецодежду (костюм), свернув наружной стороной внутрь и поместить ее в одноразовый мешок с последующим замачиванием в растворе дезинфицирующего средства;*
- *обработать руки в перчатках (1-2 минуты), в емкости с рабочим дезинфицирующим раствором;*
- *снять очки откинув их от лица держа руками вперед, вверх и назад за голову и двукратно протереть спиртосодержащим кожным антисептиком;*
- *снять маску, не касаясь лица наружной ее стороной и поместить в мусорный мешок;*
- *обработать руки в перчатках (1-2 мин.) в емкости с рабочим дезинфицирующим раствором;*
- *снять перчатки и поместить их в мусорный мешок;*
- *тщательно (не менее 30 сек.) помыть руки с мылом;*
- *протереть руки и открытые участки лица и тела спиртосодержащим кожным антисептиком;*
- *по возможности принять душ.*

6. Ответственность.

6.1. Обслуживающий персонал несет ответственность за соблюдение требований настоящей инструкции по проведению дезинфекции помещений учреждения при коронавирусной инфекции.

6.2. При наличии признаков коронавируса необходимо соблюдать режим самоизоляции. В случае нарушения требований и создания угрозы распространения заболевания коронарусной инфекцией или его распространения, распространения могут привлечь к уголовной ответственности по статье 236 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

6.3. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое стало причиной массового заражения или создало возможным условия для этого, может быть наказано лишением свободы до двух лет, ограничением свободы для этого, может быть наказано лишением штрафом от 500 до 700 тысяч рублей.

6.4. Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается на заместителя директора по хозяйственной части, при отсутствии таковой должности на руководителя.